

RIZOSPRINT

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ | ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ



ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ | 0



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως *Fusarium*, *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizactonia*, *Sclerotinia*, *Phoma*.

Οι μυκορριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ :

Οργανική ουσία
Μυκορριζα 2% (*Glomus spp.*)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1×10^6 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.

ΜΟΡΦΗ : Στερεό-Κοκκώδες

ΔΡΑΣΗ :

Επιμήκυνση ριζών, σχηματισμός ριζικών τριχιδίων, καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε την σκόνη.
P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P304-340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
P402 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
P501 Απόσυρση του περιεχομένου/συσκευασίας σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φυτώριο	2 Κιλά / m ³ τύρφη	Κατά την περίοδο των φυτεύσεων και της σποράς στο φυτώριο.
Χωράφι	3 Κιλά / 1.000 M ²	Εφαρμογή στην επιφάνεια σποράς με <i>microgranulator</i> / ειδικό βάρος 0,9.
Κατά τη μεταφύτευση κηπευτικών και καλλωπιστικών φυτών	1-3 Γρ. / φυτό	Στη θέση φύτευσης.
Κατά την μεταφύτευση δένδρων και αμπέλου.	5-10 Γρ. / φυτό	Στη θέση φύτευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μην το αναμιγνύετε με καλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΗ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).

